



Algorithm for the triage of persons presenting for Pfizer-COVID-19 vaccine

	PROCEED WITH VACCINATION	PRECAUTION TO VACCINATION	CONTRAINDICATION TO VACCINATION
CONDITIONS	CONDITIONS <ul style="list-style-type: none"> Immunocompromising conditions Pregnancy Lactation ACTIONS <ul style="list-style-type: none"> Additional counseling* 15-minute observation period 	CONDITIONS <ul style="list-style-type: none"> Moderate/severe acute illness ACTIONS <ul style="list-style-type: none"> Risk assessment Potential deferral of vaccination 15-minute observation period if vaccinated 	CONDITIONS <ul style="list-style-type: none"> None ACTIONS <ul style="list-style-type: none"> N/A
ALLERGIES	ALLERGIES <ul style="list-style-type: none"> History of food, pet, insect, venom, environmental, latex, etc., allergies History of allergy to oral medications (including the oral equivalent of an injectable medication) Non-serious allergy to vaccines or other injectables (e.g., no anaphylaxis) Family history of anaphylaxis ACTIONS <ul style="list-style-type: none"> 15-minute observation period 	ALLERGIES <ul style="list-style-type: none"> History of severe allergic reaction (e.g., anaphylaxis) to another vaccine (not including Pfizer-BioNTech vaccine) History of severe allergic reaction (e.g., anaphylaxis) to an injectable medication ACTIONS: <ul style="list-style-type: none"> Risk assessment Potential deferral of vaccination 30-minute observation period if vaccinated 	ALLERGIES <ul style="list-style-type: none"> History of severe allergic reaction (e.g., anaphylaxis) to any component of the Pfizer-BioNTech vaccine ACTIONS <ul style="list-style-type: none"> Do not vaccinate

* See Special Populations section for information on patient counseling in these group

Contraindications and precautions

Package insert:

– Severe allergic reaction (e.g., anaphylaxis) to any component of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine is a contraindication to vaccination.

– Appropriate medical treatment used to manage immediate allergic reactions must be immediately available in the event an acute anaphylactic reaction occurs following administration of the vaccine.

Because of reports of anaphylactic reactions in persons vaccinated outside of clinical trials, the additional following guidance is proposed:

– A severe allergic reaction to any vaccine or injectable therapy (intramuscular, intravenous, or subcutaneous) is a precaution to vaccination at this time.

– Vaccine providers should observe patients after vaccination to monitor for the occurrence of immediate adverse reactions:

- Persons with a history of anaphylaxis : 30minutes
- All other persons : 15mins

	PROCEED WITH VACCINATION	PRECAUTION TO VACCINATION	CONTRAINDICATION TO VACCINATION
ALLERGIES	<p>ALLERGIES</p> <ul style="list-style-type: none"> •History of food, pet, insect, venom, environmental, latex, etc., allergies •History of allergy to oral medications (including the oral equivalent of an injectable medication) •Non-serious allergy to vaccines or other injectables (e.g., no anaphylaxis) •Family history of anaphylaxis <p>ACTIONS</p> <ul style="list-style-type: none"> •15-minute observation period 	<p>ALLERGIES</p> <ul style="list-style-type: none"> •History of severe allergic reaction (e.g., anaphylaxis) to another vaccine (not including Pfizer-BioNTech vaccine) •History of severe allergic reaction (e.g., anaphylaxis) to an injectable medication <p>ACTIONS:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Risk assessment •Potential deferral of vaccination •30-minute observation period if vaccinated 	<p>ALLERGIES</p> <ul style="list-style-type: none"> •History of severe allergic reaction (e.g., anaphylaxis) to any component of the Pfizer-BioNTech vaccine <p>ACTIONS</p> <ul style="list-style-type: none"> •Do not vaccinate

Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (Centers for Disease Control and Prevention - **CDC**)

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ Pfizer-BioNTech COVID-19 στους Αλλεργικούς ασθενείς.

December 13, 2020

Amanda Cohn, MD Sarah Mbaeyi, MD, MPH



ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ Pfizer-COVID-19

ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΜΕ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ	ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ	ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ
<p>ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ιστορικό αλλεργίας σε τροφές, κατοικίδια ζώα, έντομα, δηλητήριο υμενοπτερών, περιβαλλοντικά αλλεργιογόνα, latex (λάτεξ), κ.α. • Ιστορικό αλλεργίας σε φάρμακα ληφθέντα από το στόμα (περιλαμβανομένων των από το στόμα ισοδύναμων ενός ενέσιμου φαρμάκου). • Μη-σοβαρή αλλεργία σε εμβόλια ή άλλα ενέσιμα φάρμακα (π.χ. όχι-αναφυλαξία) • Οικογενειακό ιστορικό αναφυλαξίας. <p>ΔΡΑΣΕΙΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15-λεπτά περίοδος ιατρικής παρακολούθησης μετά τον εμβολιασμό. 	<p>ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ιστορικό σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης (π.χ. αναφυλαξία) σε άλλο εμβόλιο (μη-περιλαμβανομένου του Pfizer-BioNTech εμβολίου). • Ιστορικό σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης (π.χ. αναφυλαξίας) σε ένα ενέσιμο φάρμακο. <p>ΔΡΑΣΕΙΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εκτίμηση του κινδύνου. • Πιθανή αναβολή του εμβολιασμού. • 30-λεπτά περίοδος ιατρικής παρακολούθησης μετά τον εμβολιασμό. 	<p>ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ιστορικό σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης (π.χ. αναφυλαξία) σε οποιοδήποτε συστατικό του εμβολίου Pfizer-BioNTech COVID-19. <p>ΔΡΑΣΕΙΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Όχι εμβολιασμός

Αντενδείξεις και προφυλάξεις

Ένθετο συσκευασίας:

- Σοβαρή αλλεργική αντίδραση (π.χ. αναφυλαξία) σε οποιοδήποτε συστατικό του εμβολίου Pfizer-BioNTech COVID-19.
- Κατάλληλη ιατρική θεραπεία αντιμετώπισης άμεσης αλλεργικής αντίδρασης πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμη, για την περίπτωση οξείας αναφυλακτικής αντίδρασης που μπορεί να εμφανιστεί μετά τη χορήγηση του εμβολίου.

Λόγω των αναφερόμενων αναφυλακτικών αντιδράσεων σε ανθρώπους που

εμβολιάστηκαν εκτός κλινικών μελετών, προτείνονται οι επιπλέον ακόλουθες οδηγίες:

- Μια σοβαρή αλλεργική αντίδραση σε οποιοδήποτε εμβόλιο ή ενέσιμη θεραπεία (ενδομυϊκή, ενδοφλέβια ή υποδόρια) απαιτεί προσοχή στον εμβολιασμό αυτή την στιγμή.
- Οι υγειονομικοί πάροχοι των εμβολίων θα πρέπει να παρακολουθούν τους εμβολιασθέντες μετά τον εμβολιασμό για την πιθανή εμφάνιση άμεσων ανεπιθύμητων αντιδράσεων:
 - ⇒ 30 λεπτά για τα άτομα με οποιοδήποτε ιστορικό αναφυλαξίας
 - ⇒ 15 λεπτά για όλα τα άλλα άτομα.